



Caractéristiques du bassin

Bassin versant du Bras St-Michel

Milieu humain	Autres* Foin
Agriculture (56 %)	Unité animale (U.A.) 17 664 U.A. dominante : Porc, bovin laitier Culture annuelle 2320 ha Culture pérenne 7544 ha Non définie 977 ha Avoine Orge Soya Mais Autres*: Biologique, canola, cultures mixtes, autres céréales, maraîchers, petits fruits
Barrages	4 barrages de faible contenance, sur le ruisseau de la Chute, le bras St-Michel (St-Gervais), et sur deux tributaires de la rivière du Sud
Contraintes	Dépotoir au sud-est de St-Gervais
Milieu physique	
Types de sol	Loam sableux : 34 % ; Loam : 36 % ; Argile : 4 % ; Affleurement rocheux : 3 % ; Loam argileux : 14 % ; Organique : 5 % ; Alluvions non différenciées : 4 % Altitude (m)
Topographie	Sommet: 355 m Basses Terres du St-Laurent: 65 %; Appalaches: 35 %
Contraintes naturelles	Zone inondable dans la section centrale du bras St-Michel, zones d'érosion et de glissement de terrain en aval du bras St-Michel, près de la riv. du Sud
Drainage du sol	Rapidement drainé : 24 % ; Bien drainé : 38 % ; Imparfaitement drainé : 21 % ; Mal drainé : 10 % ; Non défini : 7 %
Géologie	Mudrock et ardoise, grès dans la section centrale (à l'est du bras St-Michel)
Climat	Moyennes annuelles Température : 3,7 °C ; Précipitations : 1167 mm Station climatique : Honfleur et St-Michel, Env. Canada (Normales climatiques 1971-2000)

Écologie	
Couvert forestier (38 %)	Domaine bioclimatique Érablière à tilleul : 65 % Mixte Résineux Feuillu : 2981 ha ; Mixte : 3231 ha ; Résineux : 1423 ha Coupes totales récentes (moins de 20 ans) : 446 ha
Milieux humides	Plusieurs tourbières, près du ruisseau de la Chute, du ruisseau à la Loutre et du ruisseau Boutin, entourées de zones marécageuses boisées
Aires protégées/Parcs/ Habitat faunique	Aucune/Aucun
Ressources de poissons	21 espèces recensées durant les 10 dernières années, dont l'omble de fontaine et la perchaude.
Espèces en danger	Flore : Ail des bois (vulnérable) et 3 espèces susceptibles d'être désignées, platanthère à gorge frangée, scirpe pendant et goodyerie pubescente
Qualité de l'eau	Indice de la qualité de l'eau (IQBP ₆) en 2007 : 36 (eau de mauvaise qualité, tous les usages risquent d'être compromis). Lieu : à environ 3,5 km de l'embouchure

Sources des données

Min. des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF); Min. du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP); Environnement Canada; Financière Agricole du Québec 2009.